



# PROCESSO SELETIVO 2019 – RESIDÊNCIA MÉDICA E ESPECIALIZAÇÃO

Edital nº 001/2019

## ENTRADA DIRETA

Código: 200

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva** e um questionário de percepção desta prova.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

**“Não é livre aquele que não obteve domínio próprio.”** Pitágoras

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01     • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02     • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03     • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04     Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

### NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Período de Sigilo: não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas até que o último termine sua prova, devendo todos assinar a ata de sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez. Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a utilização de chapéus ou bonés, óculos escuros, protetor auricular, o porte e utilização mesmo que desligados, de aparelhos celulares ou similares, *pager*, *beep*, controle remoto, máquinas calculadoras ou similares, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Mesmo que autorizado por exercício de cargo ou função, não será permitido o porte de armas, durante a realização da prova. Findo o prazo limite de realização das provas, os candidatos deverão entregar os cadernos de provas e as Folhas de Respostas devidamente preenchidos e assinados.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico <[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)> no dia 1º de dezembro de 2019.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS**



# ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **75 (setenta e cinco) questões de múltipla escolha** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de **Cirurgia Geral**, 15 (quinze) questões de **Clínica Médica**, 15 (quinze) questões de **Pediatria**, 15 (quinze) questões de **Ginecologia e Obstetrícia** e 15 (quinze) questões de **Medicina Preventiva e Social**, todas perfeitamente legíveis. Além disso, compõe este caderno um questionário de percepção desta prova.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

**QUESTÃO 1**

A principal causa do choque no trauma é a hipovolemia. O choque hemorrágico pode ser dividido nas classes I, II, III e IV.

A perda de sangue estimada, em percentual do volume sanguíneo, para as classes I, II, III e IV é, respectivamente, de

- A) 10, 20, 30 e 40.
- B) até 15, de 15 a 30, de 30 a 40 e maior que 40.
- C) até 5, de 5 a 10, de 10 a 20 e maior que 20.
- D) até 10, de 10 a 20, de 20 a 25 e maior que 25.

**QUESTÃO 2**

Um dos atuais focos de saúde pública, especialmente no paciente portador de doenças malignas, é a busca de marcadores que possam ajudar no diagnóstico, controle do tratamento e detecção de recidivas ou metástases.

São características de um marcador tumoral, exceto:

- A) Baixo custo.
- B) Ausência em doenças benignas.
- C) Detectabilidade em fases iniciais do câncer.
- D) Relação direta com a eficácia do tratamento.

**QUESTÃO 3**

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente masculino, 60 anos de idade, submetido a gastrectomia subtotal com linfadenectomia adequada para tratamento de câncer gástrico distal, evoluía bem com exames laboratoriais de controle normais. No quarto dia pós-operatório, apresentou quadro de dispneia súbita, associado a dor torácica à inspiração profunda, com taquicardia e taquipneia. O exame clínico do tórax com palpação, percussão e ausculta não apresentava alterações em relação ao exame do dia anterior. O exame dos membros inferiores apresentava dor à palpação da panturrilha direita e dor à dorsoflexão do pé direito.

Diante da suspeita clínica de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, a conduta deve ser

- A) manter o paciente em repouso e pedir Doppler de membros inferiores para definir o quadro.
- B) dosar D-Dímero para definir o diagnóstico e, após confirmação, iniciar tratamento.
- C) solicitar angiotomografia para confirmar o diagnóstico e, posteriormente, iniciar tratamento.
- D) iniciar tratamento com heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular tão logo seja possível, ainda sem a confirmação por exames complementares do diagnóstico.

**QUESTÃO 4**

São indicações para cirurgia em paciente portador de pancreatite crônica, exceto:

- A) Obstrução biliar.
- B) Dor intratável.
- C) Insuficiência endócrina.
- D) Suspeita de neoplasia.

**QUESTÃO 5**

Em relação às hérnias epigástricas, é correto afirmar que

- A) são mais frequentes em mulheres que em homens.
- B) ocorrem do apêndice xifoide até o púbis.
- C) produzem dor fora de proporção para seu tamanho, em virtude do encarceramento de gordura pré-peritoneal.
- D) são frequentemente de grande tamanho e requerem o uso de tela para correção.

**QUESTÃO 6**

Sobre as infecções do sítio cirúrgico, assinale a alternativa incorreta.

- A) A fonte mais comum dos micro-organismos nessas infecções é exógena.
- B) Podem ser divididas em superficial, profunda e espaço orgânico.
- C) O patógeno mais comumente associado à infecção é o *Staphylococcus aureus*.
- D) As infecções de sítio cirúrgico ocorrem mais comumente de cinco a seis dias após a cirurgia.

**QUESTÃO 7**

Tendo em vista os princípios da padronização do atendimento inicial ao politraumatizado preconizado pelo Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS), assinale a alternativa incorreta.

- A) Uma história inicial e detalhada não é essencial para iniciar a avaliação do paciente com lesões agudas.
- B) A avaliação primária não deve ser repetida e deve ser seguida até o final, passando a seguir à avaliação secundária.
- C) O paciente com maior ameaça à vida deve ser atendido primeiro.
- D) A falta de um diagnóstico definitivo não deve atrasar a aplicação do tratamento urgente indicado.

### QUESTÃO 8

A gastrectomia vertical (GV) em manga (*sleeve*)

- A) baseia-se em mecanismo puramente restritivo mecânico.
- B) é o procedimento bariátrico mais eficiente e reversível, se necessário.
- C) é rápida, fácil e melhora o refluxo gastroesofágico preexistente.
- D) consiste na retirada vertical da grande curvatura gástrica.

### QUESTÃO 9

Considerando a fisiopatogenia da apendicite aguda, sua principal causa é a

- A) obstrução por fecalito.
- B) obstrução por neoplasia.
- C) obstrução por parasita intestinal.
- D) compressão por linfáticos periapendiculares.

### QUESTÃO 10

Com relação ao papel da endoscopia na hemorragia digestiva alta (HDA), assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) A endoscopia é de extrema importância nos casos de sangramento do trato gastrointestinal superior, seja no diagnóstico, podendo classificar a natureza da lesão, ou como terapia intervencionista.
- ( ) A endoscopia pode ser utilizada para avaliar a mucosa visualmente, mas não permite a biópsia de lesões suspeitas de neoplasia.
- ( ) Nos casos de sangramento do trato gastrointestinal superior, a endoscopia deve ser realizada dentro de 24 horas.
- ( ) O desfecho de pacientes com HDA é afetado pelo tempo que a endoscopia é realizada e pela qualidade do tratamento endoscópico naqueles que dela necessitam.

Assinale a sequência correta.

- A) V F F F
- B) F V F V
- C) V F V V
- D) F V V F

### QUESTÃO 11

Analise o caso clínico a seguir.

Um paciente masculino, de 42 anos de idade, branco, comparece ao ambulatório com queixas de emagrecimento e fezes com muco e sangue escuro. Cólicas abdominais ocasionais, sem alteração do hábito intestinal. Refere ser tabagista de 15 cigarros/dia e etilista social. Submetido à colonoscopia, observa-se uma lesão vegetante em cólon sigmoide proximal, tomando 75% da circunferência do lúmen do órgão e uma lesão polipoide sésil em cólon ascendente, com cerca de 1 cm de diâmetro com aspecto adenomatoso. Na história familiar desse paciente, o pai faleceu de acidente automobilístico aos 31 anos de idade. A mãe é viva e sadia. Avô paterno faleceu de câncer de bexiga aos 55 anos de idade. Duas tias do lado paterno faleceram com câncer de endométrio. A avaliação genética desse paciente mostrou genes hLMH1, hSMH2 e hSMH6 mutados.

Como deve ser conduzido esse caso clínico?

- A) Na colonoscopia, deve-se realizar polipectomia do cólon ascendente e posterior colectomia segmentar esquerda. Realizar avaliação dos filhos e de todos os irmãos.
- B) Na colonoscopia, deve-se realizar polipectomia do cólon ascendente e posterior colectomia segmentar esquerda. Não há necessidade da avaliação dos irmãos, somente dos filhos.
- C) Na colonoscopia, não há necessidade de realizar polipectomia; deve-se submeter o paciente a uma colectomia total proximal com íleo-reto-anastomose e realizar avaliação dos filhos e irmãos do paciente.
- D) Na colonoscopia, não há necessidade de realizar polipectomia; deve-se submeter o paciente a uma colectomia total proximal com íleo-reto-anastomose e realizar avaliação somente dos filhos.

### QUESTÃO 12

Sobre equilíbrio hidroeletrólítico do paciente cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- A) Deve ser mantido um débito urinário acima de 300 mL/h.
- B) A alteração eletrolítica mais comum no pós-operatório é a hiponatremia.
- C) Deve ser utilizada infusão de potássio no pós-operatório imediato.
- D) Cálcio deve ser repostado a partir do segundo dia de pós-operatório, em todos os casos.

### QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Um homem de 65 anos de idade encontra-se internado no hospital no pós-operatório imediato a uma herniorrafia inguinal à direita. Seus exames pré-operatórios apresentaram-se sem alterações. Às duas horas da madrugada, a técnica de enfermagem recorre ao médico plantonista, pois o paciente é encontrado nu, recusa-se a colocar novamente as roupas, fala coisas sem sentido e não reconhece o familiar que o acompanha. Sua cirurgia foi realizada na manhã anterior, sem intercorrências, tendo ele recebido meperidina após o procedimento cirúrgico e metoclopramida devido a náuseas. Não se alimentou o dia todo e, ao exame físico, não se apresentaram alterações. O exame do seu estado mental mostra desorientação, não atende pelo nome e não sabe onde está, além de estar hipotenso e um pouco sonolento.

Diante desse quadro, o médico plantonista deve

- A) prescrever um benzodiazepínico intravenoso para a sedação do paciente e avaliar complicações pós-operatórias.
- B) avaliar a necessidade das medicações em uso, colocar o paciente em um quarto com boa iluminação e prescrever um antipsicótico, se constatada agitação psicomotora.
- C) conter fisicamente o paciente e iniciar sedação com midazolam intravenoso, enquanto aguarda avaliação psiquiátrica.
- D) manter conduta expectante, dado que esses quadros regridem espontaneamente em poucas horas, e prescrever um benzodiazepínico, se constatada agitação psicomotora.

### QUESTÃO 14

Os dois índices mais confiáveis para avaliação do risco pré-operatório são

- A) ASA e APACHE II.
- B) Goldman e APACHE II.
- C) APACHE II e APACHE III.
- D) ASA e Goldman.

### QUESTÃO 15

Em relação à anatomia de superfície da região inguinal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Abaixo da pele e do tecido subcutâneo, fica a aponeurose do músculo oblíquo interno.
- B) O ligamento inguinal estende-se da crista ilíaca anterossuperior até o tubérculo púbico.
- C) A fáscia mais superficial do tecido celular subcutâneo, variável em espessura, é denominada fáscia de Camper.
- D) O ligamento de Hesselbach localiza-se medialmente ao anel inguinal profundo, entre as fossas inguiniais externa e média.

## CLÍNICA MÉDICA

### QUESTÃO 16

Considere um paciente jovem, com passado de doença reumática, evoluindo com dispnéia aos pequenos esforços. Realizou ecocardiograma transtorácico, que mostrou estenose mitral importante, com escore de Block de 8.

Em relação a esse escore, utilizado na avaliação de pacientes com estenose mitral, deve-se considerar os seguintes critérios:

- A) Calcificação, espessamento, mobilidade das cúspides e trombo em átrio esquerdo.
- B) Calcificação, espessamento, mobilidade das cúspides e grau de regurgitação.
- C) Calcificação, espessamento, mobilidade das cúspides e aparato subvalvar.
- D) Calcificação, espessamento, mobilidade das cúspides e diâmetro do anel valvar.

### QUESTÃO 17

Em relação à terapia medicamentosa para insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida, assinale a alternativa incorreta.

- A) A terapia com a associação de sacubitril e valsartana não reduziu a taxa de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca crônica classe II a IV de NYHA.
- B) A ivabradina pode ser indicada no tratamento da insuficiência cardíaca crônica nos pacientes em que o betabloqueador não consegue atingir a meta de frequência cardíaca em torno de 60 bpm.
- C) Os digitálicos estão indicados em pacientes com insuficiência cardíaca crônica para melhora de sintomas, porém, não alteram a mortalidade.
- D) A espirolactona, comprovadamente, reduz a mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca crônica.

### QUESTÃO 18

Em relação à cardiopatia congênita de comunicação interatrial (CIA), assinale a alternativa incorreta.

- A) A CIA tipo *ostium secundum* é a forma anatômica mais comum.
- B) Ao exame físico, é possível observar desdobramento paradoxal de segunda bulha (B2), que desaparece com a inspiração.
- C) As características radiológicas clássicas são: cardiomegalia (por aumento do átrio e ventrículo direitos) e dilatação das artérias pulmonares centrais.
- D) O tratamento percutâneo da CIA depende de suas características anatômicas e da sua localização.

### QUESTÃO 19

Sobre o exame físico na fibrilação atrial, assinale a alternativa incorreta.

- A) Existe nítida variação na amplitude de pulso, sendo essa menor quanto mais próxima estiverem as ondas de pulso.
- B) Com um reforço pré-sistólico aumentado, a ausculta de uma quarta bulha em borda esternal inferior esquerda é perceptível, principalmente, em frequências cardíacas mais elevadas.
- C) Invariavelmente, há irregularidade da frequência cardíaca.
- D) O traçado de pulso jugular apresenta abolição da onda A.

### QUESTÃO 20

Com relação à indicação e ao uso de anticoagulante oral na fibrilação atrial persistente ou permanente, assinale a alternativa incorreta.

- A) A anticoagulação oral está indicada em todo paciente com fibrilação atrial associada a miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica.
- B) O escore de risco de sangramento, *has-bleed*, aumentado não é uma contraindicação absoluta ao uso de anticoagulante oral na fibrilação atrial.
- C) Idade, sexo, frequência cardíaca são fatores a serem considerados para se anticoagular um paciente com fibrilação atrial.
- D) Os novos anticoagulantes orais, inibidores diretos da trombina, podem ser indicados a pacientes com fibrilação atrial associada a insuficiência leve da válvula mitral nativa.

### QUESTÃO 21

Após a administração de fibrinolítico no infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, indica-se a intervenção coronariana percutânea de resgate na seguinte situação:

- A) Quando há aumento de troponina após seis horas de administração do fibrinolítico.
- B) Sempre e imediatamente após o término da fibrinólise.
- C) Manutenção da dor torácica e / ou se não houver redução de pelo menos 50% do supradesnivelamento do ST no eletrocardiograma.
- D) Se o paciente apresentar ritmo idioventricular acelerado ao eletrocardiograma.

### QUESTÃO 22

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, com história pregressa de febre reumática na infância e uso de penicilina G benzatina 1 200 000 UI entre os 16 e 18 anos de idade. Procurou pronto-socorro com relato de dispneia progressiva iniciada há aproximadamente um ano, com piora importante há dez dias, quando passou a ocorrer aos mínimos esforços, associada a palpitações. Quando em repouso, assintomática. Ao exame: corada, hidratada, sem edema de membros inferiores. Aparelho cardiovascular: bulhas arritmicas com sopro diastólico grau 3 de Levine em região de ictus cardíaco. Aparelho respiratório: eupneica, sons respiratórios normais com crepitações em bases de ambos os pulmões, FR: 16 irpm. Abdome: normotenso. Indolor.

Exames de laboratório: hb: 12,3; gl: 7 300; plt: 220 000; Cr: 0,9; Na: 135; K: 4,2.

Radiografia de tórax: índice cardiorácico aumentado às custas de átrio esquerdo. Eletrocardiograma: fibrilação atrial. Ecocardiograma: valvulopatia acarretando disfunção valvar grave.

Assinale a alternativa que indica a classe funcional da NYHA (New York Heart Association), a disfunção valvar e o tratamento adequado.

- A) CF NYHA IV / Estenose mitral / Tratamento medicamentoso.
- B) CF NYHA III / Insuficiência aórtica / Tratamento cirúrgico.
- C) CF NYHA II / Insuficiência aórtica / Tratamento medicamentoso.
- D) CF NYHA III / Estenose mitral / Tratamento cirúrgico.

### QUESTÃO 23

São condições clínicas tipicamente associadas a exsudato pleural, exceto:

- A) Câncer.
- B) Infecções virais.
- C) Tuberculose.
- D) Insuficiência cardíaca.

### QUESTÃO 24

São drogas que podem ser usadas para controle de frequência cardíaca em pacientes hemodinamicamente estáveis com fibrilação atrial de alta resposta ventricular, exceto:

- A) Verapamil.
- B) Metoprolol.
- C) Atropina.
- D) Diltiazem.

### QUESTÃO 25

Em relação às intoxicações exógenas, assinale a alternativa incorreta.

- A) Bicarbonato de sódio via oral deve ser administrado após a ingestão de ácidos, a fim de neutralizar quimicamente estes agentes.
- B) N-acetilcisteína pode ser útil nas intoxicações por acetaminofeno.
- C) Não se deve induzir êmese após a ingestão de álcalis.
- D) Agitação, psicose e convulsões podem ser tratadas com benzodiazepínicos nas intoxicações por anfetaminas.

### QUESTÃO 26

Em relação aos efeitos adversos dos opioides no tratamento de dor, assinale a alternativa incorreta.

- A) A constipação intestinal é comum em qualquer dose de opioide, e a tolerância a esse efeito colateral não se desenvolve ao longo do tempo.
- B) Neurotoxicidade induzida por opioides inclui mioclonia, hiperalgesia, delírio e convulsões.
- C) Náusea devido ao uso de opioides pode ocorrer com o início da terapia.
- D) Depressão respiratória é comum com o uso de opioides, mesmo quando utilizados em baixas doses.

### QUESTÃO 27

Sobre a doença de Crohn, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) Início insidioso, febre baixa e diarreia são manifestações clínicas encontradas na doença de Crohn.
- ( ) A doença de Crohn não acomete o intestino delgado, limitando-se aos intestinos grosso e reto, sendo o cólon descendente o mais atingido.
- ( ) A doença de Crohn limita-se à superfície mucosa do cólon, não atingindo planos mais profundos.
- ( ) O tabagismo está associado ao desenvolvimento da doença de Crohn, à resistência à terapia médica e à recaída precoce da doença.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

### QUESTÃO 28

Em relação aos distúrbios de potássio, assinale a alternativa incorreta.

- A) Hipocalemia grave pode induzir arritmias e rhabdomiólise.
- B) Onda T achatada e QRS estreito ao eletrocardiograma (ECG) sugerem hipercalemia.
- C) O gradiente de concentração transtubular de potássio (TTKG) é capaz de distinguir entre as perdas renais e as perdas não renais de potássio.
- D) A hipercalemia pode se desenvolver em pacientes que tomam inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueadores de receptores de angiotensina.

### QUESTÃO 29

Analise as afirmativas a seguir relativas à diarreia.

- I. Redução do volume fecal com jejum e aumento do gap osmótico fecal podem sugerir diarreia osmótica.
- II. Grande volume, pequena mudança com jejum e gap osmótico fecal normal podem sugerir diarreia secretória.
- III. Febre, hematoquezia e dor abdominal podem sugerir diarreia de causa inflamatória.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 30

Em relação às hemorragias agudas do trato gastrointestinal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Hematoquezia geralmente está presente nos casos de sangramento digestivo baixo, embora também possa ocorrer em sangramentos originados no trato gastrointestinal alto.
- B) A hemorragia digestiva baixa é definida por sangramento que se origina do intestino grosso, ou seja, do ceco em diante.
- C) O sangramento cessa espontaneamente na maioria dos casos de hemorragia digestiva aguda baixa.
- D) Colonoscopia, sigmoidoscopia e angiografia podem ser usados na propeidêutica de hemorragia digestiva baixa.

**QUESTÃO 31**

Considere o caso clínico a seguir.

Criança do sexo masculino, 9 anos de idade, dá entrada em pronto-socorro com queixa de dor nas pernas e perda de força nelas. Relata que, no dia anterior, sentiu um formigamento nos membros inferiores. Mãe relata que há 15 dias paciente teve um quadro de pneumonia atípica tratada com claritromicina, sendo previamente uma criança hígida, sem intercorrências na gestação, parto e desenvolvimento.

Ao exame físico, tinha força reduzida globalmente, pior em membros inferiores, ausência de reflexos osteotendíneos, nervos cranianos sem sinais de acometimento e restante de exame sem alterações dignas de nota. Realizado líquido que mostrou uma célula por mm<sup>3</sup>, 3 hemácias por mm<sup>3</sup>, glicose de 75 mg/dL e proteína 120 mg/dL, hemograma e íons sem alterações.

Diante do exposto, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Síndrome de Guillain Barré.
- B) Mielite transversa.
- C) ADEM (encefalomielite disseminada aguda).
- D) Neuromielite óptica (doença de Devic).

**QUESTÃO 32**

Considere que um recém-nascido de 5 dias de vida cursa com prostração, inapetência e abaulamento de fontanela anterior. Feito líquido, que confirmou meningite bacteriana.

Nessa faixa etária, qual é o agente etiológico mais provável?

- A) Pneumococo.
- B) Meningococo.
- C) *Haemophilus influenzae*.
- D) Streptococo do grupo B.

**QUESTÃO 33**

Em relação à vacina pentavalente oferecida no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para crianças, assinale a alternativa incorreta.

- A) Confere proteção contra difteria, tétano, coqueluche, *Haemophilus influenzae* e hepatite B.
- B) O esquema de aplicação preconizado é realizado aos 2, 4 e 6 meses de vida.
- C) São eventos adversos graves relacionados à vacina: convulsões e episódio hipotônico hiporresponsivo.
- D) Essa vacina é indicada para crianças maiores de 7 anos que não a receberam na primeira infância.

**QUESTÃO 34**

Em relação ao transtorno específico da linguagem, assinale a alternativa correta.

- A) Quando do atraso do desenvolvimento da linguagem, não é possível considerar a existência de alterações já no período que antecede o aparecimento de estruturas verbais, chamado período pré-linguístico.
- B) A comunicação apenas por gestos e onomatopeias dentro do período linguístico configura um dos distúrbios mais comuns do desenvolvimento da fala.
- C) Os estímulos ambientais são fatores irrelevantes para o desenvolvimento de distúrbios da fala, principalmente quanto às distorções e omissões de fonemas.
- D) O transtorno específico de linguagem denomina a limitação de linguagem que ocorre nas crianças com evidência de alteração neurológica, auditiva ou intelectual já identificada.

**QUESTÃO 35**

Analise o caso clínico a seguir.

Adolescente, 12 anos de idade, é internada com quadro de febre de 37,8 °C a 38,3 °C, dor torácica, tosse seca, pouca intensidade, há dez dias. Estava em uso de amoxicilina, no quinto dia, para tratamento de uma pneumonia, porém sem imagem radiológica. O tratamento foi instituído com dados apenas clínicos. A adolescente relata que uma colega de turma esteve afastada devido a uma pneumonia.

O exame físico revelou adolescente com regular estado geral, acianótica, ausência de linfadenopatia palpável, hidratada, com 30 irpm, murmúrio diminuído nos dois terços inferiores do hemitórax direito. Raio X de tórax com opacidade em hemitórax direito com obliteração do seio costofrênico. Ultrassonografia do tórax mostrando condensação com presença de derrame pleural à direita.

Em relação ao caso apresentado, é correto afirmar que se trata de um caso

- A) suspeito de tuberculose e deve-se realizar PPD coleta de líquido pleural para teste rápido Gene Xpert-MTB/RIF, cultura líquida em meio específico; escore do Ministério da Saúde maior ou igual a 40 recomenda iniciar tratamento.
- B) suspeito de tuberculose e deve-se realizar coleta de líquido para cultura em meio específico, aguardar resultado e iniciar esquema tríplice se resultado positivo.
- C) típico de uma pneumonia atípica com derrame pleural, deve-se iniciar claritromicina e realizar drenagem torácica.
- D) de uma pneumonia comunitária complicada com derrame pleural de provável etiologia pneumocócica resistente a penicilina; deve ser iniciada ceftriaxona.



### QUESTÃO 36

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, 3 anos de idade, apresenta-se com quadro de febre intermitente há um mês, associado a dor em membros inferiores. Hemograma revela leucopenia com neutropenia importante e também plaquetopenia leve.

Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- A) O paciente deve ser encaminhado ao reumatologista por provável diagnóstico de artrite idiopática juvenil.
- B) O corticoide deve ser iniciado imediatamente, independentemente do diagnóstico do paciente.
- C) Um exame indicado para esse paciente é o mielograma para avaliar presença de blastos.
- D) A idade do paciente deixa improvável algum diagnóstico reumatológico ou oncológico.

### QUESTÃO 37

Analise o caso clínico a seguir.

Em um plantão na enfermaria, um médico admite criança de 3 anos de idade para investigação de quadro febril. Mãe relata febre persistente de início há nove dias. Refere que, no início do quadro, os olhos ficaram vermelhos, sem eliminação de secreção, agora já em melhora. Ao exame físico, observa-se ainda exantema micropapular difuso, eritema dos lábios com língua em framboesa, nódulo cervical à direita medindo cerca de 2 cm, sem sinais flogísticos e edema e eritema das mãos, sem outras alterações, hemodinamicamente estável. Mãe negou comorbidades, alergias ou uso de medicações. Vacinação em dia.

Diante do quadro apresentado, qual a conduta mais indicada?

- A) Solicitar sorologias para as doenças exantemáticas mais comuns e aguardar para diagnóstico preciso, antes de iniciar qualquer tratamento.
- B) Solicitar exames laboratoriais, como VHS, PCR, hemograma e ecocardiograma; contudo, resultados não devem atrasar o início do tratamento.
- C) Iniciar tratamento com imunoglobulina (2 g/kg, dose única) e AAS em altas doses (80-100 mg/kg), que deve ser mantido por no mínimo um ano após diagnóstico.
- D) Aguardar realização de ecocardiograma para posteriormente avaliar início do tratamento específico com imunoglobulina e AAS.

### QUESTÃO 38

Considere o caso clínico a seguir.

Criança de 1 ano e 6 meses é levada a uma consulta médica. Iniciou com quadro de febre e mal-estar. Após 24 horas de evolução, apresentou coriza, conjuntivite e tosse. No quarto dia de doença, evoluiu com erupção maculopapular eritematosa em linha de implantação dos cabelos, envolvendo fronte, região retroauricular e região superior da nuca, com progressão para face, pescoço, membros superiores e tronco. No sétimo dia de doença, comparece ao pronto-atendimento, mantendo exantema, sem descamação. Ao exame, encontrava-se em regular estado geral, com hiperemia de orofaringe e exantema mencionado. Pais apresentam caderneta da criança com as seguintes vacinas administradas: BCG e Hepatite B.

Diante do quadro apresentado, é correto afirmar que se trata de um caso

- A) típico de exantema súbito.
- B) provável de sarampo.
- C) provável de rubéola.
- D) provável de doença de Kawasaki.

### QUESTÃO 39

Analise o quadro clínico a seguir.

Lactente de 2 meses de vida apresenta-se em pronto-atendimento com quadro de cansaço e dificuldade de mamada. Nega febre. Ao exame físico: REG, hipocorado 1+, hidratado; FC: 170 bpm, bulhas cardíacas rítmicas, FR: 70 rpm, murmúrio vesicular com crepitações difusas e sibilos esparsos; esforço durante a mamada. Abdomem com fígado palpável a 5 cm do rebordo costal direito. Radiografia de tórax com presença de cardiomegalia e aumento de trama vascular pulmonar.

Em relação a esse quadro, assinale a alternativa correta.

- A) A sepse de foco pulmonar justifica todos os sintomas apresentados pelo paciente, não necessitando de outros exames de imagem.
- B) O broncoespasmo é a principal hipótese diagnóstica, e o uso de b2-agonista é indispensável nesse momento.
- C) O paciente está em insuficiência cardíaca e necessita realizar um ecocardiograma com Doppler.
- D) Se esse paciente estiver com rápido ganho de peso, a doença de base está compensada.

#### QUESTÃO 40

Considere que um lactente de 6 meses de vida iniciou com quadro de tosse e coriza por quatro dias, evoluiu com cansaço, persistência da tosse seca e “chieira”. Exame físico: bom estado geral, corado e hidratado; FR: 60 rpm, murmúrio vesicular com crepitações e retração de fúrcula leve; saturação de oxigênio: 95% em ar ambiente. Ausência de história de asma na família. Nega sibilância prévia.

Em relação a esse caso, assinale alternativa correta.

- A) O exame de imagem de tórax é obrigatório, sendo fundamental para o diagnóstico do paciente.
- B) O tratamento não farmacológico pode ser o único necessário, e a evolução do quadro pode ser benigna.
- C) O salbutamol é a droga consagrada e de escolha para a melhora do paciente em questão.
- D) A internação é obrigatória para todos os lactentes menores de 2 anos de idade e na presença de comorbidades.

#### QUESTÃO 41

Considere um paciente de 3 anos de idade com quadro de febre de 39 °C há sete dias, palidez importante, regular estado geral, hepatoesplenomegalia. Realizado hemograma: Hb: 6,9 g/dL, Ht 21%, leucócitos globais: 800/mm<sup>3</sup>; segmentados: 40%, linfócitos: 50%, monócitos: 10%, plaquetas: 120 000/mm<sup>3</sup>.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A) O início de antibiótico de amplo espectro está indicado nessa situação, mesmo sem o paciente ter um diagnóstico etiológico definitivo.
- B) O agente etiológico mais provável é viral, a conduta mais correta é hidratação oral domiciliar, já que o paciente não se apresenta hemoconcentrado.
- C) O uso de antibiótico é obrigatório nessa situação, visto que o paciente tem uma infecção bacteriana.
- D) Esse paciente corre risco iminente de sangramento pela plaquetopenia e está indicada transfusão de hemácias e plaquetas.

#### QUESTÃO 42

O tratamento de uma criança de cinco anos de idade com pneumonia adquirida na comunidade, sem complicações e com hemocultura positiva para *Streptococcus pneumoniae* sensível a todos os antibióticos testados, deve ser feito com

- A) penicilina cristalina, por ser específica, e, com isso, selecionar menos bactérias resistentes.
- B) oxacilina, para cobrir também o *Staphylococcus aureus* da comunidade.
- C) amoxicilina com clavulanato para cobrir o *Streptococcus pneumoniae* de resistência intermediária.
- D) ceftriaxona, para cobrir o sistema nervoso central e prevenir uma meningite bacteriana.

#### QUESTÃO 43

Analise o quadro clínico a seguir.

Um lactente de 2 anos de idade é levado ao pronto-atendimento devido a choro inconsolável durante a madrugada enquanto dormia em colchão no chão, em um barracão, numa área de ocupação. Ao exame, o paciente estava irritado, com mácula eritematosa em antebraço esquerdo, sudorese profusa, bradicárdico e com crepitações à ausculta pulmonar bilateralmente.

Diante desse quadro, é correto afirmar:

- A) O paciente pode ter sido picado por um escorpião amarelo, e o quadro é considerado grave, sendo necessária a infusão de soro específico.
- B) Trata-se de um quadro clínico sugestivo de erucismo por lagarta *Lonomia sp*, e o paciente necessita receber antifibrinolítico.
- C) O pediatra deve pensar em picadura por *Crotalus sp*, realizar um torniquete no local da picada e transferir o paciente para outro hospital.
- D) O quadro clínico é sugestivo de acidente com aranha armadeira, *Phoneutria sp*, e o paciente deverá receber alta com analgésicos comuns.

#### QUESTÃO 44

A apresentação de pacientes pediátricos, em pronto-atendimento, com quadro de infecções de vias aéreas superiores (IVAS) tem alta prevalência.

Quanto a tonsilites e faringites agudas, assinale a alternativa correta.

- A) A causa mais comum de faringoamigdalites em crianças acima de 5 anos de idade é bacteriana, sendo o agente mais comum o estreptococo beta-hemolítico do grupo A.
- B) O uso de antibioticoterapia de forma inadequada em casos de IVAS tem sido causa de surgimento de cepas bacterianas resistentes aos antimicrobianos.
- C) As cepas de *Streptococcus viridans* são sempre consideradas patogênicas em pacientes de idade pediátrica, principalmente se isoladas em tonsilas palatinas.
- D) O diagnóstico de faringite e tonsilite de causa bacteriana deve ser realizado preferencialmente de forma clínica, evitando-se a identificação por meios de culturas.

#### QUESTÃO 45

Em relação à transmissão vertical da hepatite B, é correto afirmar:

- A) A maioria dos recém-nascidos de mãe com hepatite B entra em remissão espontânea, observando-se a negatificação do antígeno e do DNA viral.
- B) Recém-nascidos de mãe com hepatite B devem receber apenas imunoglobulina humana anti-HBV (IGHAHB) nas primeiras 12 horas de vida.
- C) Recém-nascidos de mãe com hepatite B devem receber apenas vacina de DNA recombinante anti-hepatite B nas primeiras 12 horas de vida.
- D) No caso de infecção aguda na mãe, 50% das crianças podem se tornar infectadas quando a infecção ocorre no terceiro trimestre de gravidez.

### GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

#### QUESTÃO 46

A prolactina pode ser considerada o hormônio da descendência, pois garante à prole o cuidado dos progenitores.

Sobre a hiperprolactinemia, é correto afirmar que a(o)

- A) produção da prolactina na adeno-hipófise é controlada principalmente por fatores liberadores, como a serotonina sintetizada no hipotálamo.
- B) tratamento está indicado nos casos sintomáticos ou na presença de macroadenoma.
- C) amenorreia é a causa da infertilidade, sendo um dos primeiros sintomas ainda com níveis pouco elevados de prolactina.
- D) relação com hipertireoidismo é conhecida pela redução do hormônio liberador de tireotrofina (TRH).

#### QUESTÃO 47

O papilomavírus humano (HPV) teve sua associação com lesões de colo desde a década de 1970. Em 1983, Zur Hausen conseguiu clonar o DNA do HPV em pacientes com câncer de colo e recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2008.

Sobre esse vírus, é correto afirmar que

- A) os tipos de HPV mais encontrados nos casos de carcinoma de células escamosas do colo são o HPV 16 e o 18.
- B) a citologia é o principal meio de rastreamento de câncer de colo, com acuidade próxima de 98%, mesmo em lesões precursoras iniciais, como a NIC I.
- C) os principais tratamentos focais, químico, cirúrgico e uso de imunossuppressores, visam erradicar o vírus.
- D) as vacinas encontradas no mercado brasileiro são de vírus vivos atenuados, causando um aumento importante dos anticorpos capazes de destruir o HPV.

#### QUESTÃO 48

As afecções benignas do corpo uterino, muito incidentes, são importantes causas de cirurgias pélvicas e podem afetar bastante a qualidade de vida das mulheres.

Sobre essas afecções, é correto afirmar que

- A) a diferenciação entre leiomiomas e sarcomas se dá, com bom valor preditivo positivo, pelo crescimento rápido e pela biópsia de endométrio antes do tratamento cirúrgico.
- B) os leiomiomas são monoclonais com receptores de estrogênio e progesterona maiores que no miométrio, o que causa sangramento, aumentado principalmente no período pré-menopausa.
- C) a adenomiose tem o tabagismo com mais de 20 cigarros por dia como fator de risco.
- D) a infertilidade é uma consequência comum nas pacientes com adenomiose.

#### QUESTÃO 49

A endometriose é uma doença benigna de alta morbidade e tratamento muitas vezes tão invasivo quanto doenças malignas.

Sobre essa patologia, é correto afirmar que

- A) a incidência real é desconhecida, mas, na população com dor pélvica, sua incidência pode chegar a 50%.
- B) apesar de evidências do papel do sistema imune, uma história familiar positiva ainda não foi observada.
- C) as aderências tubárias são a causa da infertilidade associada a endometriose.
- D) os agonistas do GnRH, mesmo em posologia oral, são medicamentos que possuem boa resposta por bloquear as atividades dos gonadotrofos hipofisários.

#### QUESTÃO 50

A doença trofoblástica gestacional refere-se a uma variedade de tumores com origem na placenta.

Sobre essa patologia, é correto afirmar:

- A) Apesar de ter caráter familiar, um aumento na incidência não é esperado em pacientes com abortamento prévio ou com mola hidatiforme há mais de um ano.
- B) Nos casos de mola completa, é mandatório o uso de imunoglobulina anti-Rh na mãe com sangue Rh D-negativo.
- C) A mola completa se caracteriza geralmente por um cariótipo diploide, de origem inteiramente paterna, mas com maior frequência 46XX.
- D) A incidência de neoplasia trofoblástica gestacional é maior após esvaziamento de mola parcial do que após o esvaziamento de mola completa.

### QUESTÃO 51

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, atendida em determinado ambulatório com diagnóstico de incontinência urinária mista e distopias vaginais, apresentava a classificação de quantificação dos prolapso de órgãos pélvicos (POPQ) com o ponto Ba = -3, ponto Bp = +0,8 e C = -1 numa vagina de 10 centímetros de comprimento e colo de tamanho normal.

Sobre essa paciente e as patologias, é correto afirmar que

- A) ela não apresenta distopia vaginal posterior.
- B) o prolapso apical é classificado como grau III.
- C) a abordagem retropúbica ou transobturatória dos *slings* sem tensão (TVT) têm índices semelhantes de lesão vesical intraoperatória.
- D) o tratamento farmacológico do componente de urgência pode beneficiá-la antes de um possível tratamento cirúrgico da incontinência de esforço.

### QUESTÃO 52

A transição menopáusica é uma progressão endócrina gradual que leva as mulheres do período de ciclos regulares até o fim da menstruação associado a senescência ovariana.

Sobre as alterações fisiológicas desse período, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) Um dos primeiros eventos é a redução da secreção de inibina ovariana.
- ( ) Ocorre um aumento transitório na produção do sulfato de desidroepiandrosterona (SDHEA) pela suprarrenal.
- ( ) Há um aumento discreto do hormônio folículo-estimulante (FSH) e dos estrogênios com aumento da taxa de perda dos folículos ovarianos.
- ( ) Ocorre um aumento compensatório na produção da globulina de ligação ao hormônio sexual (SHBG).

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) V V V F
- C) F V F V
- D) F F F V

### QUESTÃO 53

A síndrome do ovário policístico (SOP), ou anovulação hiperandrogênica, é uma afecção comum entre as mulheres com ciclos menstruais irregulares.

Sobre essa patologia, é correto afirmar:

- A) Na fisiopatologia da doença, há um aumento do hormônio folículo estimulante (FSH) em relação ao hormônio luteinizante (LH), com uma relação de 2:1 em mais da metade dos casos.
- B) O diabetes tipo I, a hiperprolactinemia e a síndrome de Cushing podem ter sintomas parecidos com os da SOP.

- C) Mesmo pacientes com intervalo cíclicos regulares, hiperandrogenismo brando e sem alterações metabólicas, devem ser tratadas pelo risco de câncer de ovário.
- D) Mulheres com SOP que engravidam apresentam taxa elevada de abortamento precoce em relação à taxa média da população.

### QUESTÃO 54

Considerando a bacia óssea materna e o mecanismo de parto, é correto afirmar:

- A) O diâmetro anteroposterior do estreito médio da pequena bacia é constituído pelas três conjugatas (anatômica, obstétrica e diagonal).
- B) Nos casos de insinuação do polo cefálico fetal em assinclitismo, a ocorrência do parto vaginal é improvável.
- C) Os tempos do mecanismo de parto são: dilatação, período expulsivo, período de dequitação e observação.
- D) O parto vaginal pode ocorrer sem que haja a flexão do polo cefálico fetal.

### QUESTÃO 55

Em relação ao partograma, é correto afirmar:

- A) A fase latente do trabalho de parto tem duração menor que a fase ativa, geralmente até 12 horas, e a conduta deve ser expectante.
- B) Se a linha de alerta for ultrapassada, existe o risco iminente de sofrimento fetal.
- C) A parada secundária de descida é uma distocia do período de dilatação, e a fase ativa prolongada é uma distocia do período pélvico.
- D) Na parada secundária de dilatação, a dilatação permanece a mesma em dois ou mais toques consecutivos, realizados em intervalo de duas ou mais horas entre eles, e a causa principal é a desproporção cefalopélvica relativa ou absoluta.

### QUESTÃO 56

Em relação às alterações fisiológicas na gravidez, é correto afirmar:

- A) O colesterol total e os triglicérides têm elevação discreta.
- B) Ocorre um aumento dos níveis da globulina ligadora de tiroxina (TBG) por estímulo da progesterona.
- C) Mesmo com o aumento da circunferência torácica, ocorre a redução do volume residual de ar nos pulmões.
- D) Ocorre uma diminuição do fluxo renal plasmático e da taxa de filtração glomerular, predispondo às infecções urinárias.

### QUESTÃO 57

Considerando os distúrbios hipertensivos da gravidez, é correto afirmar:

- A) Os distúrbios hipertensivos na gravidez são classificados em hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica e síndrome HELLP.
- B) Gestante assintomática, com pressão arterial sistólica (PAS)  $\geq 140$  e / ou pressão arterial diastólica (PAD)  $\geq 90$  mmHg, com proteinúria de 24 horas negativa e com plaquetas abaixo de 100 000, deve ser considerada com o diagnóstico de pré-eclâmpsia.
- C) No primeiro trimestre da gravidez, ocorre uma queda fisiológica da pressão arterial, com retorno dos níveis pressóricos aos valores pré-gravídicos no início do segundo trimestre.
- D) Nos casos de pré-eclâmpsia com critérios de gravidade, deve-se aguardar o trabalho de parto espontâneo até a 37ª semana de gestação.

### QUESTÃO 58

Em relação à gestação múltipla, assinale a alternativa incorreta.

- A) Nas gestações gemelares monocoriônicas, a via de parto deve ser a via alta (cesariana) pelo risco de descolamento da placenta, com a saída do primeiro gemelar e antes da saída do segundo gemelar.
- B) Aproximadamente 5% das gestações são múltiplas na 5ª semana de gestação, mas apenas 2% são múltiplas entre a 10ª e 14ª semana.
- C) Em gestações dicoriônicas com placentas acoladas, não ocorre a síndrome da transfusão feto-fetal.
- D) Uma gestação gemelar monozigótica pode ser monocoriônica ou dicoriônica.

### QUESTÃO 59

Considerando a avaliação do bem-estar fetal, é correto afirmar:

- A) Na avaliação do perfil biofísico fetal, é possível a presença de oligo-hidrânio, pela avaliação do índice de líquido amniótico, porém com nota máxima (nota 2) para essa variável (líquido amniótico).
- B) Durante a cardiocardiografia, os valores considerados normais para a frequência cardíaca fetal são de 120 a 160 batimentos por minuto (bpm).
- C) Em uma gravidez a termo, é considerada aceleração transitória um aumento da frequência cardíaca fetal de pelo menos dez batimentos com duração de pelo menos dez segundos.
- D) A desaceleração intraparto tardia ou DIP II está relacionada à compressão do polo cefálico fetal, determinando reflexo vagal com consequente diminuição da frequência cardíaca fetal.

### QUESTÃO 60

Em relação à toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa incorreta.

- A) A transmissão fetal aumenta de 15% para 60% entre o primeiro e o terceiro trimestre de gestação.
- B) Os anticorpos IgM são detectados a partir do sétimo dia, e os anticorpos IgG, a partir do 14º dia após a contaminação materna.
- C) O teste de avididade de IgG deve ser realizado nas situações de IgM positivo e IgG negativo, até o quarto mês de gestação, para avaliar se a contaminação materna foi antes ou após a concepção.
- D) Confirmada a infecção fetal, através da reação em cadeia da polimerase (PCR), deve-se iniciar sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.

## MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

### QUESTÃO 61

Analise os seguintes princípios.

- I. Universalidade.
- II. Equidade.
- III. Integralidade.

Apresentam princípios do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

### QUESTÃO 62

Analise as seguintes diretrizes.

- I. Ordenação da rede
- II. Continuidade do cuidado
- III. Longitudinalidade do cuidado
- IV. Trabalho em equipe

São diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica

- A) I e III, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.

### QUESTÃO 63

A respeito da territorialização, considere as seguintes afirmativas.

- I. No âmbito municipal, pode-se identificar os seguintes territórios: módulo assistencial, área, microárea e moradia.
- II. A territorialização é o processo de análise territorial visando a uma base organizativa dos sistemas de saúde e do planejamento da vigilância em saúde.
- III. O conceito de território é espaço limitado político-administrativamente ou por ação de um grupo social.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

### QUESTÃO 64

Desde 1988, o Brasil tem estabelecido um sistema de saúde dinâmico e complexo (o Sistema Único de Saúde – SUS), baseado nos princípios da saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. A respeito do SUS e sua história, analise as seguintes afirmativas.

- I. O SUS tem o objetivo de prover uma atenção abrangente e universal, preventiva e curativa, por meio da gestão e prestação descentralizadas de serviços de saúde, promovendo a participação da comunidade em todos os níveis de governo.
- II. A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil.
- III. A descentralização, iniciada na década de 1990 após a promulgação das Leis Orgânicas da Saúde, se fez por meio da transferência de competências e receitas tributárias para estados e municípios.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e II, apenas.

### QUESTÃO 65

Em uma lagoa de uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, foi localizada uma população de caramujos *Biomphalaria glabrata*. Na região, não são relatados casos de esquistossomose, e os caramujos recolhidos estavam negativos para *Schistosoma mansoni*.

Essa área deve, portanto, ser definida como

- A) área indene com potencial de transmissão.
- B) área indene sem potencial de transmissão.
- C) área vulnerável.
- D) área focal.

### QUESTÃO 66

Considere que um menino de 8 anos de idade cai de uma árvore ao apanhar frutas, sofre fratura de fêmur, é internado e submetido à cirurgia. Evoluía adequadamente, mas adquire infecção hospitalar, vindo a falecer, 12 dias depois, por broncopneumonia. A respeito da declaração de óbito, analise as afirmativas a seguir.

- I. Deve ser preenchida pelo médico assistente.
- II. Deve ser preenchida pelo Instituto Médico Legal.
- III. A causa terminal é broncopneumonia.
- IV. A causa básica é fratura de fêmur.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, III e IV, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

### QUESTÃO 67

Analise o relato de uma paciente durante a consulta: “Gostei muito do grupo de parar de fumar, diz que tem um adesivo. Posso tentar? Nem sabia que poderia fazer tudo isso desse jeito. Médico olhando pra mim desse tanto doutora, fico até emocionada. Então, posso esperar pra ver se dá alguma coisa da prevenção de câncer de útero? Diz que vocês me ligam qualquer coisa? Nunca avaliaram minha mama não, primeira vez.”

Esse relato representa qual dos atributos da Atenção Primária à Saúde?

- A) Longitudinalidade.
- B) Acesso.
- C) Orientação familiar.
- D) Integralidade.

### QUESTÃO 68

Depois de ter iniciado novo emprego com carteira assinada há cerca de dez meses, um paciente de 36 anos de idade, ajudante de pedreiro, apresentou um quadro de lombalgia que se instalou progressivamente. Do ponto de vista da notificação de doença relacionada ao trabalho por meio da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), qual deve ser a conduta correta do médico assistente?

- A) Não abrir a CAT, pois essa comunicação restringe-se aos acidentes de trabalho e não se aplica em casos de doenças do trabalho.
- B) Abrir a CAT somente se for necessário que o paciente fique afastado do trabalho por mais de 15 dias, comunicando o fato à empresa.
- C) Abrir a CAT, incluindo o preenchimento do Laudo de Exame Médico, solicitando ao trabalhador que a encaminhe à empresa, de modo que esta possa dar prosseguimento ao processo junto ao INSS.
- D) Aguardar o tempo de carência de 12 meses para que o trabalhador tenha direito a benefícios pelo INSS e, depois, abrir a CAT, caso persista a lombalgia.

### QUESTÃO 69

As ações de monitoramento contínuo do país / estado / região / município / território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente, correspondem a qual componente da vigilância em saúde?

- A) Epidemiológica.
- B) Da situação de saúde.
- C) Saúde ambiental.
- D) Sanitária.

### QUESTÃO 70

Em um estudo para avaliação de um serviço de saúde, a variável "Número de pessoas na fila de espera para cirurgia eletiva" é

- A) nominal.
- B) contínua.
- C) ordinal.
- D) discreta.

### QUESTÃO 71

Na análise estatística de dados contínuos, é importante calcular as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. A esse respeito, analise as seguintes associações.

- I. Variância: é a média do quadrado dos desvios.
- II. Desvio-padrão: é a raiz quadrada da variância.
- III. Mediana: indica o valor que aparece com maior frequência na amostra.

Estão corretas as associações

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

### QUESTÃO 72

Em uma amostra de 100 homens, 90 beberam cerveja na semana anterior, enquanto, em um grupo similar de 100 mulheres, apenas 20 beberam cerveja no mesmo período.

Qual é a razão de chances (*odds ratio*) de um homem tomar cerveja em relação a uma mulher?

- A) 36.
- B) 4,5.
- C) 18.
- D) 45.

### QUESTÃO 73

Quando um pesquisador afirma que um determinado exame laboratorial tem sensibilidade de 95% para o diagnóstico de uma doença, ele está dizendo que

- A) 95% dos indivíduos que não têm essa doença terão resultado negativo nesse exame.
- B) 95% dos indivíduos que têm resultado positivo para essa doença serão verdadeiramente doentes.
- C) 5% dos indivíduos que não têm essa doença terão resultado positivo para essa doença.
- D) 5% dos indivíduos que têm essa doença terão resultado negativo para essa doença.

### QUESTÃO 74

A Razão de Mortalidade Proporcional de 50 anos de idade ou mais (ou Indicador de Swaroop Uemura) mede a proporção de mortes a partir da idade mencionada em relação à totalidade de mortes. Nesse contexto, analise as seguintes afirmativas.

- I. O coeficiente de mortalidade infantil desse local deve ser alto.
- II. A desnutrição proteico-calórica nesse local deve ser pouco prevalente.
- III. A expectativa de vida nesse local deve ser baixa.
- IV. As afecções perinatais e as anomalias congênitas devem constituir as principais causas de morte entre menores de 1 ano de idade.

Em um determinado local onde o Indicador de Swaroop Uemura é alto, pode-se afirmar que estão corretas as afirmativas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.

### QUESTÃO 75

O uso de uma amostra para fazer inferências sobre a população é vital para a pesquisa epidemiológica.

Considerando esse contexto, analise as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.

- I. O intervalo de confiança mais estreito é melhor que um intervalo de confiança mais amplo,

#### PORQUE

- II. quanto mais estreito for o intervalo de confiança, maior a probabilidade de a média amostral estar próxima da média populacional.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa correta.

- A) I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) A I é falsa, e a II é verdadeira.

## QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

O questionário a seguir visa averiguar a percepção da prova do Processo Seletivo de Residência Médica e Especialização Multiprofissional Santa Casa BH 2019 no âmbito do nível de dificuldade e qualidade das questões.

Gentileza assinalar as alternativas correspondentes à sua opinião na FOLHA DE RESPOSTAS – QUESTIONÁRIO SANTA CASA.

### QUESTÃO 1

Qual é o grau de dificuldade desta prova?

- A) Muito fácil
- B) Fácil
- C) Médio
- D) Difícil
- E) Muito difícil

### QUESTÃO 2

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?

- A) Menos de uma hora.
- B) Entre uma e duas horas.
- C) Entre duas e três horas.
- D) Entre três e quatro horas.
- E) Quatro horas, e não consegui terminar.

### QUESTÃO 3

Os enunciados das questões da prova estavam claros e objetivos?

- A) Sim, todos.
- B) Sim, a maioria.
- C) Apenas cerca da metade.
- D) Poucos.
- E) Não, nenhum.

### QUESTÃO 4

As informações / instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?

- A) Sim, até excessivas.
- B) Sim, em todas as questões.
- C) Sim, na maioria das questões.
- D) Sim, mas somente em algumas questões.
- E) Não, em nenhuma das questões.

### QUESTÃO 5

Considerando os conteúdos das questões da prova, você percebeu que:

- A) Não estudou, ainda, a maioria deles.
- B) Estudou alguns deles, mas não os aprendeu.
- C) Estudou a maioria deles, mas não os aprendeu.
- D) Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
- E) Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.



# GABARITO

## (VERSÃO DO CANDIDATO)

01	A	B	C	D	28	A	B	C	D	55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D	29	A	B	C	D	56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D	30	A	B	C	D	57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D	31	A	B	C	D	58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D	32	A	B	C	D	59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D	33	A	B	C	D	60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D	34	A	B	C	D	61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D	35	A	B	C	D	62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D	36	A	B	C	D	63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	37	A	B	C	D	64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	38	A	B	C	D	65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	39	A	B	C	D	66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	40	A	B	C	D	67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	41	A	B	C	D	68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	42	A	B	C	D	69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	43	A	B	C	D	70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	44	A	B	C	D	71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	45	A	B	C	D	72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	46	A	B	C	D	73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	47	A	B	C	D	74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D	48	A	B	C	D	75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D	49	A	B	C	D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
23	A	B	C	D	50	A	B	C	D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
24	A	B	C	D	51	A	B	C	D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
25	A	B	C	D	52	A	B	C	D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
26	A	B	C	D	53	A	B	C	D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
27	A	B	C	D	54	A	B	C	D					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.  
**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**